

AUREOMYCINE[®] SPÉCIA

POMMADE DERMATOLOGIQUE À 3 %

CHLORTETRACYCLINE

Cibler
les infections
cutanées

FRILAB⁺
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

INDICATIONS

- Traitement d'appoint des infections cutanées staphylococciques et/ou streptococciques* (furoncle, furunculose, anthrax, impétigo, sycosis, ecthyma...) et des dermatoses impétiginisées
- Eradication des staphylocoques sensibles dans les gîtes microbiens



POSOLOGIE

Pommade dermatologique à 3 %

➤ **2 ou 3 applications par jour****. Limiter la durée du traitement à 8 jours en raison du risque de sélection de germes résistants

* En cas d'infection streptococcique, une antibiothérapie par voie générale devra être envisagée.

** La forme pommade n'est pas adaptée au traitement des lésions suintantes, macérées, des plis, ni des ulcères de jambe.

● FORMES ET PRESENTATIONS

Pommade à 3 % : Tube (Alu) de 15 g.

● COMPOSITION

Chlortétracycline (DCI) chlorhydrate	p 100 g	p tube
Excipients : paraffine liquide, lanoline, vaseline.	3 g	450 mg

● INDICATIONS

- Traitement d'appoint des infections cutanées staphylococciques et/ou streptococciques (furoncle, furunculose, anthrax, impétigo, sycosis, ecthyma...) et des dermatoses impétiginisées.
- Eradication des staphylocoques sensibles dans les gîtes microbiens.

● POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

2 ou 3 applications par jour. La durée du traitement n'excédera pas 8 jours en raison du risque de sélection de germes résistants.

● CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité à l'un des constituants, en particulier à la lanoline.
- Infections mammaires, lors de l'allaitement, en raison du risque d'ingestion du produit par le nouveau-né (cf. *Grossesse et Allaitement*).

● MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mises en garde :

- En cas d'infection streptococcique, une antibiothérapie par voie générale devra être envisagée.
- La sensibilisation par voie cutanée peut compromettre l'utilisation ultérieure par voie générale d'un antibiotique de la même famille.

Précautions d'emploi :

- En raison du risque de photosensibilisation, éviter l'exposition aux rayonnements UV solaires ou artificiels.
- Risque de sélection de germes résistants en cas de traitement prolongé.
- Cette forme pommade n'est pas adaptée au traitement des lésions suintantes, macérées, des plis, ni des ulcères de jambe.

● GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ne pas utiliser en cas d'infections mammaires lors de l'allaitement, en raison du risque d'ingestion du produit par le nouveau-né.

● EFFETS INDESIRABLES

- Possibilité d'eczéma allergique de contact. Les lésions d'eczéma peuvent disséminer à distance des zones traitées.
- Risque de photosensibilisation.

● PHARMACODYNAMIE

Antibiothérapie locale (D : dermatologie). La chlortétracycline est un antibiotique de la famille des cyclines.

Laboratoires FRILAB SA

17, rue des Pierres du Niton - 1207 - Genève - SUISSE
Tél. : 00 41 22 346 33 48 - Fax : 00 41 22 789 22 05
E-mail : info@frilab.ch

FRILAB+
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES