

Soulage rapidement les spasmes abdominaux



Dysménorrhées



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

Soulage rapidement les spasmes abdominaux

Fridial[®], comprimés et suspension buvable

Composition

Comprimé: Principe actif: Bromure de prifinium 30 mg/cpr. Excipients: Amidon de maïs, Lactose monohydraté, Croscarmellose sodique, Silice colloïdale anhydre, Povidone, Stéarate de Magnésium, Opadry II rose 85F240032.

Suspension: Principe actif: Bromure de prifinium 250 mg/50 ml. Excipients: Glycyrrhizate d'ammonium, Méthylparahydroxybenzoate de sodium, Saccharose, Acide chlorhydrique dilué R2, Eau purifiée.

Indications

- Adultes :
- Douleurs dues aux spasmes et l'hypermotilité de l'appareil gastro-intestinal : Gastrite, ulcère gastroduodénal, entérite, colite syndrome postgastrectomie, le syndrome du colon irritable.
- Douleurs dues aux spasmes et dyskinésies des voies biliaires : cholécystite, cholélithiase.
- Douleur due à la pancréatite.
- Douleurs dues aux spasmes des voies urinaire : lithiase urinaire, ténesme vésical, cystite et pyélite
- Dysménorrhée et vomissement.
- Enfants:
- Atteinte fonctionnelle spasmodique de l'axe digestif du nourrisson et de l'enfant et en particulier : vomissements, syndromes douloureux abdominaux.
- Traitement complémentaire des thérapeutiques étiologiques des maladies digestives organiques.

Posologie

Posologie et mode d'administration

- Adultes: 1 à 2 comprimés trois fois par jour. Dans la colique aiguë, 3 comprimés peuvent être administrés en dose unique.
- Les comprimés doivent être administrés par voie orale. Les comprimés peuvent être pris pendant ou entre les repas.
- Enfants : 0,2 ml par kg de poids réparti en 3 prises par jour.

Pour toute information médicale précise, se référer au R.C.P du produit joint.

Laboratoires FRILAB SA

17, rue des Pierres du Niton - 1207 - Genève - SUISSE

Tél.: 00 41 22 346 33 48 - Fax: 00 41 22 789 22 05

E-mail: info@frilab.ch

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

