

ROCMALINE®

ARGININE - ACIDE MALIQUE



Double détente
contre l'asthénie

FRILAB+
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

INDICATIONS

- Asthénie sous toutes ses formes

POSOLOGIE

- 3 ampoules par jour aux repas à diluer dans un verre d'eau.
Cure de 15 jours renouvelable



Ampoules buvables

● FORMES ET PRESENTATIONS

Solution buvable : ampoules de 10 ml, boîte de 20.

● COMPOSITION

	p amp	p boîte
Arginine (DCI) ou L (+) arginine exprimé en base anhydre	413 mg	8,26 g
Acide DL-malique	1,5 g	30 g

Excipients : saccharose (1 g/amp), cyclamate de sodium, saccharine sodique, sulfite de sodium anhydre arôme prune, eau purifiée.

● POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

3 ampoules par jour aux repas à diluer dans un verre d'eau.

● MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mises en garde :

Ce produit contient des sulfites.

Précautions d'emploi :

En cas de diabète, de régime hypoglycémique, tenir compte dans la ration journalière de la teneur en saccharose d'une ampoule.

Laboratoires FRILAB SA
17, rue des Pierres du Niton - 1207 - Genève - SUISSE
Tél. : 00 41 22 346 33 48 - Fax : 00 41 22 789 22 05
E-mail : info@frilab.ch

ULTRAMARINE - 2018

