Antinal®

Nifuroxazide

Quand l'asepsie digestive est essentielle



Large spectre d'activité anti-bactérien

FRILAB
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

ANTINAL2015.indd 1 09/11/15 13

Antinal®

Nifuroxazide

Quand l'asepsie digestive est essentielle

Antinal®, gélules et suspension buvable

Composition

Gélule : Chaque gélule contient : Nifuroxazide 200 mg. Excipients : Stéarate de magnésium, Croscarmellose sodique, Sucrose, Amidon de maïs.

Suspension : 5 ml de suspension contiennent: Nifuroxazide 220 mg. Excipients : Acide citrique monohydrate, C.M.C (cekol 1000), Avicel RC 581, Saccharine Sodique, Sodium Propylparaben, Sodium Méthylparaben, Benzoate de sodium, Banane liquide, Tween 80, Aerosil 200, Eau purifiée.

Indications

- Diarrhées aiguës et chroniques
- Gastroentérite
- Colites aiguës et chroniques
- Tous les autres types de diarrhée et infections intestinales
- Diarrhée du voyageur

Posologie

Posologie et mode d'administration

À moins d'une autre prescription par le médecin, la dose usuelle est la suivante :

- **Adultes :** 1 gélule 4 fois/jour.
- **Enfants :** - Enfant en-dessous de 2 mois :
  1 cuillère à café (5 ml) 2 fois/jour
  - Enfant de 2 mois à 1 an :
  1 cuillère à café (5 ml) 3 fois/jour
  - Enfant de plus d'1 an :
  1 cuillère à café (5 ml) 4 fois/jour

NB : la dose peut être augmentée selon la réponse clinique.

Pour toute information médicale précise, se référer au R.C.P du produit joint.

Laboratoires FRILAB SA
17, rue des Pierres du Niton - 1207 - Genève - SUISSE
Tél. : 00 41 22 346 33 48 - Fax : 00 41 22 789 22 05
E-mail : info@frilab.ch

ULTRAMARINE - 2015

FRILAB
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES